

Diagnóstico temprano de cáncer en niñas, niños y adolescentes

Uno o más síntomas o signos que duren 15 días o más, pueden ser dato de sospecha en niñas, niños y adolescentes.



- Sudoración excesiva y nocturna
- Pérdida de peso
- Cansancio
- Sangrado por nariz o encías
- Moretones sin explicaciones
- Puntos rojos (petequias) sin explicación
- Palidez

Realizar biometría hemática completa inmediata.

- Dolor de cabeza (cefalea) persistente
- Aumento rápido de perímetro cefálico >p90
- Alteraciones en la marcha

Realizar resonancia magnética o TAC de cráneo (simple y contrastada).

- Dolor de huesos
- Aparición de masas en cualquier parte del cuerpo
- Fracturas patológicas

Realizar radiografía, AP y lateral comparativa de la extremidad.

- Distensión abdominal y/o pélvica

Realizar Ultrasonido abdominal y/o pélvico.

- Adenomegalia (crecimiento de ganglios linfáticos)
- Crecimiento de los ganglios axilares, cervicales, inguinales y/o poplíteos
- Aumento y/o endurecimiento testicular

Valoración por oncología pediátrica.

En caso de sospecha de cáncer infantil, acuda directamente e inmediatamente a consulta de pediatría u oncología/hematología pediátrica.